

CAPITOLUL VIII. MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ȘI CALITATEA VIEȚII

VIII.1. Mediul urban și calitatea vieții: stare și consecințe

VIII.1.1. Calitatea aerului din aglomerările urbane și efectele asupra sănătății

VIII.1.1.1. Depășiri ale concentrației medii anuale de PM₁₀, NO₂, SO₂ și O₃ în anumite aglomerări urbane

Indicator RO 04: Depășirea valorilor limită privind calitatea aerului în zonele urbane
Indicatorul reprezintă procentul populației urbane potențial expusă la concentrații atmosferice (în $\mu\text{g}/\text{m}^3$) de dioxid de sulf (SO₂), particule în suspensie (PM₁₀), dioxid de azot (NO₂) și ozon (O₃) ce depășesc valoarea limită stabilită pentru protecția sănătății umane.

Concentrațiile de NO₂ din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$), care nu trebuie depășită de mai mult de 18 ori/an și valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Concentrațiile de SO₂ din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane ($350 \mu\text{g}/\text{m}^3$) care nu trebuie depășită de mai mult de 24 ori/an, și valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane ($125 \mu\text{g}/\text{m}^3$) care nu trebuie depășită de mai mult de 3 ori/an.

Concentrațiile de CO din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită pentru protecția sănătății umane ($10 \text{mg}/\text{m}^3$), calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă).

Concentrațiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind pragul de alertă ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ măsurat timp de 3 ore consecutiv) calculat ca medie a concentrațiilor orare, pragul de informare ($180 \mu\text{g}/\text{m}^3$) calculat ca medie a concentrațiilor orare și valoarea țintă pentru protecția sănătății umane ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$) calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă), care nu trebuie depășită de mai mult 25 ori/an.

Concentrațiile de particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni - **PM₁₀** din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită zilnică, determinată gravimetric, ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$), care nu trebuie depășită de mai mult 35 ori/an și valoarea limită anuală, determinată gravimetric ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Concluzii: În conformitate cu Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, nu s-au semnalat depășiri ale valorilor limită/ valorilor țintă, pragului de alertă și pragului de informare la nici unul dintre poluanții monitorizați în ultimii 5 ani, cu excepția ozonului, la care s-au înregistrat următoarele depășiri ale valorii țintă pentru protecția sănătății umane de $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$:

- în anul 2016 - 9 depășiri, din care 6 depășiri în stația de fond urban GL2 și 3 depășiri în stația de fond industrial GL5;
- în anul 2017 - 5 depășiri, din care 4 depășiri la stația de fond suburban GL3 și 1 depășire la stația de fond industrial GL4;

Cauza depășirii o constituie condițiile meteo deosebite de temperatură și radiație solară, precum și calm atmosferic, care au favorizat producerea și acumularea ozonului.

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2 0 1 7 ~

Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, numărul maxim de depășiri ale valorii țintă la indicatorul ozon, este de 25 ori într-un an calendaristic. Nu s-a depășit numărul maxim admis în niciuna din stațiile automate de monitorizare a calității aerului, la nivelul județului Galați.

VIII.1.2. Poluarea fonică și efectele asupra sănătății și calității vieții

VIII.1.2.1. Expunerea la poluarea sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250.000 locuitori

Zgomotul ambiental afectează o mare parte din populația mediului urban, care îl percepe ca fiind una dintre problemele majore de mediu. Zgomotul este asociat cu multe activități umane, dar zgomotul rutier, feroviar și al traficului aerian are cel mai mare impact. Aceasta este o problemă deosebită pentru mediul urban; aproximativ 75% din populație locuiește în orașe, iar volumul traficului este în continuă creștere.



Decibelul (dB) este unitatea de măsură fiziologică de percepție de către urechea umană a celei mai slabe excitații sonore. Valoarea 80 de decibeli reprezintă pragul la care intensitatea sunetului devine nocivă.

Dovezile științifice arată că expunerea prelungită la niveluri ridicate ale poluării fonice poate duce la efecte grave asupra sănătății în zonele controlate de sistemul endocrin uman și de creier, cum ar fi afecțiuni cardiovasculare, tulburări de somn și iritare (un sentiment de disconfort care afectează bunăstarea generală). Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), poluarea fonică duce la o rată

a îmbolnăvirilor aflată pe locul doi, după poluarea aerului, în rândul cauzelor legate de mediu în Europa.

La nivelul UE, **Directiva 2002/49/CE privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental** este instrumentul legislativ principal pentru protejarea cetățenilor de poluarea fonică excesivă determinată de traficul rutier, feroviar și aerian, precum și de instalațiile industriale mari. Pentru a-și atinge obiectivele declarate, Directiva privind zgomotul ambiental se concentrează pe trei domenii de acțiune:

- determinarea expunerii la zgomotul ambiental asigurând punerea la dispoziția publicului a informațiilor privind zgomotul ambiental și efectele acestuia;
- prevenirea și reducerea zgomotului ambiental acolo unde este necesar și
- păstrarea calității zgomotului acolo unde este bună.

Directiva se aplică zgomotului la care este expusă populația, în special în zonele construite, în parcuri publice sau în alte zone liniștite dintr-o aglomerație, în apropierea școlilor, spitalelor și a altor clădiri și zone sensibile la zgomot. Nu se aplică zgomotului provocat de persoana expusă, cel cauzat de activitățile domestice, produs de vecini, la locul de muncă, din mijloacele de transport sau datorită activităților militare în zonele militare.

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2 0 1 7 ~

Cu toate acestea, este important de semnalat că directiva nu stabilește valori limită sau țintă și nici nu prescrie măsurile care trebuie incluse în planurile de acțiune, lăsând astfel aceste aspecte la discreția autorităților competente.

Directiva a fost transpusă în legislația românească prin **Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient, actualizată și republicată.**

Implementarea progresivă a acestei hotărâri presupune realizarea următoarelor măsuri:

- a) determinarea expunerii la zgomotul ambient, prin realizarea cartării zgomotului;
- b) asigurarea accesului publicului la informațiile cu privire la zgomotul ambient și a efectelor sale;
- c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambient.

Harta de zgomot este o reprezentare grafică a distribuirii nivelului sunetului într-o regiune anume, pentru o perioadă de timp bine definită. Acestea au ca scop evidențierea zonelor locuite unde nivelul de zgomot se ridică peste anumite limite impuse de legislație și astfel folosește la elaborarea de planuri de acțiune de protecție a locuitorilor împotriva expunerii și reducerea nivelurilor de zgomot.

Acestea sunt create pe bază de date de intrare care sunt apoi procesate cu ajutorul PC cu software specializat. Aplicațiile software țin cont de obstacolele din zona respectivă care pot fi bariere, forma și caracteristicile acustice ale terenului, condiții meteo și altele. Pentru minimizarea erorilor date de precizia datelor statistice de intrare și pentru urmărirea implementării eventualelor măsuri de reducere se efectuează și măsurători de zgomot utilizând aparatură specifică (sonometre) sau echipamente de monitorizare a zgomotului. Elaborarea hărților strategice de zgomot pentru aglomerări presupune cartarea separată, pentru indicatori ai nivelului de zgomot L_{zsn} (nivelul de zgomot zi-seara-noapte) și L_n (nivelul de zgomot noapte), a următoarelor surse de zgomot: traficul rutier, traficul feroviar, aeroporturi, zonele industriale în care se desfășoară activități privind prevenirea și controlul integrat al poluării, inclusiv pentru porturi.

Hărțile strategice de zgomot care prezintă situația anului calendaristic precedent pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale, porturile și aeroporturile mari, **se elaborează și se aprobă până la data de 30 iunie 2012 și se revizuiesc dacă este cazul, cel puțin la fiecare 5 ani de la această dată.**

În urma evaluării rezultatelor cartografierii acustice, pentru zonele unde se descoperă depășiri ale nivelurilor limită, autoritățile responsabile iau măsuri de reducere a emisiei, cuprinse în Planurile de acțiune. Planul de acțiune este o continuare naturală a procesului de cartare strategică a zgomotului. Hărțile de zgomot sunt inutile dacă nu se întreprind sau cel puțin nu sunt planificate acțiuni care să se ocupe de problemele de zgomot evidențiate de cartarea zgomotului.

Planurile de acțiune destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia, incluzând măsuri de reducere a zgomotului **se elaborează și se aprobă până la data de 18 iulie 2013 și se revizuiesc dacă este cazul**, atunci când se produc modificări importante care afectează situația existentă privind nivelul zgomotului și **cel puțin la fiecare 5 ani de la această dată.** La elaborarea planurilor de acțiune privind gestionarea zgomotului, autoritățile trebuie să consulte publicul interesat.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient, responsabilitatea întocmirii hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune în județul Galați aparține următoarelor instituții:

CAPITOLUL VIII –MEDIUL URBAN, SANATATEA SI CALITATEA VIETII
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2 0 1 7 ~

- **Primăria Municipiului Galați** - pentru municipiul Galați;
- **Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA Galați** -

pentru Portul Galați (Port Docuri, Port Bazinul Nou, Port Mineralier).

Analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot și a rapoartelor aferente acestora se realizează în conformitate cu prevederile **Ordinului Ministerului Mediului nr. 1323/12.10.2017**, de către Comisia întocmită la nivelul APM Galați.

După verificarea respectării cerințelor Anexei nr. 5: Cerințe minime pentru cartarea strategică de zgomot din HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental republicată și actualizată, precum și ale Anexei nr. 4 din Ordinul MMDD nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot, acerea se aprobă, după cum urmează:

- pentru municipiul Galați, prin Hotărârea Consiliului Local,
- pentru portul Galați, prin Ordin al Ministerului Transporturilor.

Hărțile strategice de zgomot pentru portul Galați au fost finalizate și aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1471/05.10.2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806/12.10.2017.

➤ **Analiza Hărților strategice de zgomot ale portului Galați**

Număr total de **locuitori** expuși la valori ale Lzsn și Lnoapte (în sute)

Tabel VIII.1.2.1.1. Număr de locuitori expuși la valori ale Lzsn și Lnoapte (în sute)

Port Galați							
Nivel de zgomot (dB)	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>75
Număr de locuitori expuși (în sute) la valori ale Lzsn	0	0	0	0	0	0	0
Număr de locuitori expuși (în sute) la valori ale Lnoapte	0	0	0	0	0	0	0
Număr de locuințe expuse (în sute) la valori ale Lzsn	0	0	0	0	0	0	0
Număr de locuințe expuse (în sute) la valori ale Lnoapte	0	0	0	0	0	0	0

➤ **Analiza Hărților strategice de zgomot ale municipiului Galați**

Număr total de **locuitori** expuși la valori ale Lzsn și Lnoapte (în sute)

Tabel VIII.1.2.1.2. Număr de locuitori expuși la valori ale Lzsn (în sute)

Aglomerarea Galați	Nivel zgomot (dB)				
	55-59	60-64	65-69	70-74	>75
Sursa de zgomot	Număr de locuitori expuși la valori ale Lzsn (in sute)				

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI
~ 2 0 1 7 ~

Trafic rutier, drumuri	32	12	4	1	6
Trafic feroviar, tramvai	26	49	21	1	0
Industrie	6	2	1	0	0

Tabel VIII.1.2.1.3. Număr de locuitori expuși la valori ale Lnoapte (în sute)

Aglomerarea Galați	Nivel zgomot (dB)						
	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>75
Sursa de zgomot	Număr de locuitori expuși la valori ale Ln (in sute)						
Trafic rutier, drumuri	125	731	1119	641	316	148	46
Trafic feroviar, tramvai	27	36	40	1	0	0	0
Industrie	11	5	2	1	0	0	0

Număr total de **locuințe** expuse la valori ale Lzsn și Lnoapte (în sute)

Tabel VIII.1.2.1.4. Număr de locuințe expuse la valori ale Lzsn (în sute)

Aglomerarea Galați	Nivel zgomot (dB)				
	55-59	60-64	65-69	70-74	>75
Sursa de zgomot	Număr de locuințe expuse la valori ale Lzsn (in sute)				
Trafic rutier, drumuri	263	536	358	187	124
Trafic feroviar, tramvai	12	23	10	1	0
Industrie	3	1	0	0	0

Tabel VIII.1.2.1.5. Număr de locuințe expuse la valori ale Lnoapte (în sute)

Aglomerarea Galați	Nivel zgomot (dB)						
	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>75
Sursa de zgomot	Număr de locuințe expuse la valori ale Ln (in sute)						
Trafic rutier, drumuri	60	350	537	306	151	71	22
Trafic feroviar, tramvai	13	17	19	0	0	0	0
Industrie	5	2	0	0	0	0	0

Număr total de **locuințe sensibile** expuse la valori ale Lzsn și Lnoapte (în sute)

Tabel VIII.1.2.1.6. Număr de locuințe sensibile expuse la valori ale Lzsn (în sute)

Aglomerarea Galați	Nivel zgomot (dB)				
	55-59	60-64	65-69	70-74	>75
Sursa de zgomot	Număr de locuințe sensibile expuse la valori ale Lzsn (in sute)				
Trafic rutier, drumuri	0	3	3	1	1
Trafic feroviar, tramvai	0	0	0	0	0
Industrie	0	0	0	0	0

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI
~ 2017 ~

Tabel VIII.1.2.1.7. Număr de locuințe sensibile expuse la valori ale L_{noapte} (în sute)

Aglomerarea Galați	Nivel zgomot (dB)						
	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>75
Sursa de zgomot	Număr de locuințe sensibile expuse la valori ale L _n (in sute)						
Trafic rutier, drumuri	0	1	4	2	1	0	0
Trafic feroviar, tramvai	0	0	0	0	0	0	0
Industrie	0	0	0	0	0	0	0

Accesul publicului la informațiile obținute în urma cartării zgomotului ambiant se realizează prin afișarea hărților strategice de zgomot și a rapoartelor aferente acestora, pe site-ul instituțiilor responsabile cu realizarea acestora, respectiv:

- pentru portul Galați, pe site-ul C.N.A.P.D.M. SA, link:
http://www.romanian-ports.ro/html_nou/planuri_mediu.php;
- pentru aglomerarea Galați, pe site-ul Primăriei municipiului Galați, link:
<http://www.primariagalati.ro/portal/index.php>.

Ca urmare a evaluării rezultatelor cartografierii acustice, C.N.A.P.D.M. SA respectiv Primăria municipiului Galați au obligația elaborării și aprobării până la data de 18 iulie 2018, a următoarelor documente:

- Planul de acțiune destinat gestionării zgomotului și a efectelor acestuia pentru portul Galați;
- Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot și a efectelor acestuia pentru municipiul Galați.

➤ **Măsurări de zgomot efectuate de APM Galați în 2017**

Pentru stabilirea nivelului de poluare fonică, APM monitorizează sursele de zgomot în municipiul Galați printr-o rețea formată din puncte de monitorizare reprezentând: artere rutiere, parcuri și piețe.

Rezultatele măsurărilor efectuate în anul 2017, în municipiul Galați sunt prezentate sintetic în tabelul VIII.1.2.1.8:

Tabelul VIII.1.2.1.8

Tip măsurare zgomot	Punct de măsurare	Număr măsurări	Nivel echivalent de zgomot maxim măsurat dB(A)	Număr depășiri	Nivel de zgomot admisibil dB(A)
Parcuri, zone recreere și odihnă	Grădina Publică	8	59,0	-	60
	Orășelul Copiilor	8	60,9	1	60
	Parc Viva	9	60,3	1	60
	Parc Cloșca	9	62,2	2	60
Parcaje auto	-	-	-	-	-

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI
~ 2017 ~

Stradă de categorie tehnică I, magistrală	Str. Oțelarilor – Zona acces Turn TV	9	71,1	-	75÷85
Stradă de categorie tehnică II, de legătură	Str. Brăilei – Spitalul de Urgență "Sf. Apostol Andrei"	9	72,8	6	70
	B-dul G. Coșbuc – Zona Cimitirul Eternitatea	8	73,0	7	70
	Str. Domnească – Zona Poliție	7	73,4	2	70
	B-dul Marea Unire – Faleza superioară	9	76,9	7	70
	Str. Basarabiei – Zona Parchetul de pe lângă Curtea de Apel	7	73,0	4	70
	Str. 1 Decembrie 1918 – Zona Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu"	6	71,7	2	70
	Str. Traian – Spitalul de boli infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”	7	74,5	3	70
Piețe	Piața Micro 19	8	67,7	-	70
	Piața Micro 14	7	63,6	-	70
	Piața Centrală	9	68,2	-	70
	Piața Micro 17	8	66,6	-	70

- **Valori ale nivelului de zgomot echivalent măsurat în parcuri 2017 (tabel VIII.1.2.1.9, fig. VIII.1.2.1.1., tabel VIII.1.2.1.10, fig. VIII.1.2.1.2.)**

Tabel. VIII.1.2.1.9. Medii trimestriale 2017


Parcuri	2017			
	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim IV
	Nivel de zgomot echivalent măsurat, dB(A)			
Grădina Publică	54,9	51,9	51,3	53,3
Orășelul Copiilor	52,1	56,0	58,7	53,4
Parc Viva	51,7	53,6	53,6	59,4
Parc Cloșca	52,0	54,2	60,1	58,8
Valoarea limită	60 dB(A) *			

*Valoare limită admisibilă conform SR 10009 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI
~ 2017 ~

Fig. VIII.1.2.1.1

Valori ale nivelului de zgomot echivalent masurat in parcuri, medii trimestriale 2017




Tabel VIII.1.2.1.10. Medii semestriale 2017

Parcuri	2017	
	Nivel de zgomot echivalent măsurat, dB(A)	
	Semestrul I	Semestrul II
Grădina Publică	53,9	52,5
Orășelul Copiilor	54,1	56,0
Parc Viva	52,6	57,1
Parc CLOȘCA	52,7	59,5
Valoarea limită	60 dB(A) *	

*Valoare limită admisibilă conform SR 10009 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Fig. VIII.1.2.1.2

Valori ale nivelului de zgomot echivalent masurat in parcuri, medii semestriale 2017



RAPORT JUDEȚEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI
~ 2 0 1 7 ~

➤ **Sesizări primite de la cetățeni privind zgomotul datorat surselor fixe și mobile**

Tabel VIII.1.2.1.11

Anul	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Nr. sesizări	-	-	4	1	-	5	11

* Sesizările primite de la persoane fizice sau asociații de proprietari se referă la zgomotul produs de activitățile desfășurate sau de instalațiile existente pe amplasamentele:

- terasa Vilei Bordeaux (SC ANA SOFT), str. G-ral Alexandru Cernat nr. 77;
- restaurantul SC SERAFIN SS SRL, b-dul Domnească nr. 130;
- turbina eoliană aparținând SC ROMSTAL IMEX SRL, sat Costi comuna Vînători;
- restaurant Diamond, str. Pictor Isser;
- spălătoria auto SC Nufărul White SRL, str. Lozoveni nr 231;
- curtea ACR, str. Radu Negru nr 3;
- aparatul de climatizare de pe clădirea Home Center str. Lahovary/Bălcescu;
- aparatul de climatizare de pe clădirea SC Max Fitness, str. Bălcescu nr. 24;
- restaurantul ZOLOTKO, Drumul de Centură.

Acestea au fost redirectionate către instituțiile abilitate, respectiv GNM-Comisariatul Județean Galați, sau după caz Direcția de Sănătate Publică Galați, Poliția Locală, Primăria Galați.

VIII.1.3. Calitatea apei potabile și efectele asupra sănătății

Apa potabilă este apa care, consumată direct sau folosită pentru prepararea diverselor produse alimentare, nu trebuie să pună în pericol sănătatea consumatorilor.

Criteriile de potabilitate sunt definite printr-un ansamblu de parametri organoleptici, fizico-chimici și microbiologici reglementați legal.



Vorbim despre aproximativ 55 de parametri și de conformarea la fiecare dintre aceștia în orice moment, fără excepție, parametri care dau caracterul de apă potabilă, bună pentru consum.

La nivelul Uniunii Europene, apa potabilă este reglementată prin Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.

În România, apa potabilă este definită și reglementată prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată și actualizată. Monitorizarea de control se realizează pentru un număr de aproximativ 15 compuși sau caracteristici ce ar putea avea un efect negativ relativ rapid în legătură cu deteriorarea stării de sănătate a persoanelor care consumă acea apă.

Analiza apei se face numai pe probe recoltate corespunzător, în laboratoare pentru analiza apei, de către personal specializat, cu metode de analiză specifice, cu rezultate măsurabile, în urma cărora se trag concluzii legate de potabilitate, care se înscriu în buletine de analiză corespunzătoare.

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2 0 1 7 ~

Câteva dintre cele mai importante aspecte de care depinde calitatea apei pe care o bem sunt: temperatura, culoarea, gustul, mirosul, turbiditatea, concentrația de săruri și nivelul pH-ului, clorul rezidual sau duritatea apei.

- **Temperatura, culoarea, mirosul și gustul**

Temperatura apei potabile se înregistrează între 8 și 12 °C. În cazul apelor subterane, a căror temperatură este constantă, temperatura poate fi un indicator indirect de poluare, atunci când în sursa de apă pătrund poluanți din exterior.

Apa potabilă nu are culoare și nici miros. Apa colorată intens indică o poluare cu substanțe toxice, la fel cum apa care miroase poate fi un indicator al unor elemente naturale regăsite în exces în sursa respectivă.

Apa potabilă are un gust plăcut. Un gust metalic al apei indică o concentrație crescută de fier. Un gust sălcii, indică o concentrație crescută de calciu. Gustul amar este determinat de magneziu iar cel sărat de cloruri.

- **Turbiditatea**

Reprezintă transparența unui lichid și este unul dintre cei mai importanți parametri ai apei potabile.

Dacă în apă există materii nedizolvate, particule de natură organică sau anorganică, atunci apa își pierde din claritate, iar calitatea este slabă.

- **Conținutul de cloruri**

Analiza apei care determină nivelul de salinitate este importantă mai ales în zonele de coastă, unde din cauza infiltrațiilor, apare un gust sărat sau amar. Apa cu o salinitate ridicată este extrem de corozivă și nu este recomandată nici pentru cosum.

- Prin pH se măsoară și se exprimă nivelul de aciditate al apei într-un interval valoric de la 0 la 14. Pentru organismul uman, pH-ul apei trebuie să fie cuprins între 6,8 – 8,5, adică să fie neutru. Atunci când pH-ul apei este sub 5,6 se consideră că apa este acidă. Atunci când pH-ul trece de 11, apa este alcalină și irită ochii, pielea și mucoasele.
- Specialiștii din întreaga lume sunt de acord asupra eficienței clorului în dezinfectarea apei potabile și distrugerea factorilor din apă ce ne pot afecta sănătatea. La fel de adevărat și dovedit științific este și efectul nociv al clorului asupra sănătății în timp; chiar și într-o cantitate foarte mică, poate fi extrem de periculos pentru femeile însărcinate și pentru bebeluși.

- **Duritatea**

O prezență excesivă de săruri de calciu, magneziu și aluminiu în apă se întâlnește de obicei în apele provenite din puțuri. Duritatea excesivă face ca aceste ape să nu poată fi folosite în niciun domeniu, casnic sau industrial, datorită agresivității chimice care provoacă depuneri de săruri de calciu și magneziu pe conducte iar consumul zilnic al acestora conduce adesea la formarea de calculi renali.

Fiecare oraș trebuie să aibă stații de tratare a apei, astfel încât apa care iese din stațiile de tratare să îndeplinească toate criteriile de potabilitate pentru a putea fi livrată clienților casnici.

Societatea Apă Canal S.A. Galați monitorizează în permanență calitatea apei furnizate către populația din localitățile județului Galați care au delegat serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare operatorului regional, având ca principală responsabilitate asigurarea unui serviciu care se încadrează în standardele impuse de normativele și legislația în vigoare.

CAPITOLUL VIII –MEDIUL URBAN, SANATATEA SI CALITATEA VIETII
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2 0 1 7 ~

În municipiul Galați apa brută este tratată în Stațiile Uzina de apă nr. 2, Turnul de Apă și Filești înainte de a fi furnizată către populație. Monitorizarea calității apei se face zilnic atât la ieșirea din Uzine cât și în rețeaua de distribuție.

Conform:

- prevederilor Legii 458/2002, republicată, privind calitatea apei potabile;
- programului de monitorizare de control al apei potabile, în conformitate cu prevederile Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a apei potabile, aprobate prin HG 974/2004 cu modificările și completările ulterioare,

monitorizarea calității apei potabile în municipiul Galați se face în baza unui program de monitorizare aprobat de Direcția Județeană de Sănătate Publică Galați. Acesta prevede frecvența recoltărilor, indicatorii urmăriți și locațiile de prelevare a probelor de apă rece potabilă. Punctele de control (62 în municipiul Galați) sunt clar definite și sunt stabilite de comun acord cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Galați, funcție de numărul de locuitori.

Analizele pentru determinarea valorilor indicatorilor fizico-chimici și bacteriologici ai apei sunt efectuate de către Laboratorul de Apă Potabilă din cadrul Serviciului Laboratoare Calitate al SC APA CANAL SA, laborator care este înregistrat la Ministerul Sănătății, în Registrul Laboratoarelor care efectuează monitorizarea de control a calității apei potabile, cu Certificat de înregistrare nr. 318/07.07.2016. Acesta participă anual la scheme de intercomparare alături de alte laboratoare din țară cât și din alte țări, pentru a-și evalua competențele profesionale, demonstrând astfel calitatea rezultatelor furnizate.

De asemenea, calitatea apei potabile furnizată de SC APA CANAL SA este monitorizată și de Direcția Județeană de Sănătate Publică Galați, cu competență în controlul respectării condițiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătății publice.

Sursa: SC APA CANAL SA Galați

➤ Influența calității apei potabile asupra sănătății umane

Apa influențează sănătatea populației în mod direct (prin calitățile sale biologice, chimice și fizice) sau indirect. Astfel, cantitatea insuficientă de apă duce la menținerea unei stări insalubre, a deficiențelor de igienă corporală, a locuinței și a localităților, ceea ce duce la răspândirea unor afecțiuni digestive (dezinteria și hepatita endemică), a unor boli de piele.

Bolile umane, produse ca urmare directă a calității apei, pot fi clasificate în:

- boli cauzate de infecții răspândite prin consum de apă infectată (diareea, febra tifoidă, hepatita A, salmoneloză);
- boli cauzate de infecții transmise prin animale acvatice (bilharzioza);
- boli cauzate de infecții răspândite prin insecte cu stagii acvatice (malaria, oncocercoză);
- boli cauzate de infecții transmise prin animale acvatice nevertebrate.

O altă influență directă a apei asupra sănătății populației se produce prin calitățile sale, respectiv prin compoziția sa. O serie întregă de boli netransmisibile sunt considerate astăzi ca fiind determinate sau favorizate de compoziția chimică a apei:

- gușa endemică - lipsa sau carența de iod poate declanșa producerea acesteia,
- caria dentară - lipsa de fluor și în primul rând lipsa de fluor în apă, care asigură de la 2/3 până la 4/5 din necesarul zilnic al organismului uman,
- afecțiunile cardiovasculare;

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2 0 1 7 ~

- methemoglobinemia (intoxicația cu nitriți) - produsă de excesul nitriților din apa de băut sau alimentație. Nitriții ajung în apă prin fertilizarea terenurilor agricole cu îngrășăminte naturale (gunoi de grajd) sau îngrășăminte azotoase sintetice,

- intoxicația cu plumb - din apă și alimente se absorbe 3-10%, acumularea având loc când se depășește potențialul de eliminare. Particulele de plumb pătrund în sânge și se răspândesc în tot organismul. Plumbul pătrunde lent în organism, distribuindu-se în oase (40-90%), ficat (922%), rinichi (11%), etc.

- intoxicația cu cadmiu - cadmiul este considerat cel mai toxic element din mediul înconjurător (alături de Pb, Hg și As), utilizarea sa la scară industrială declanșând o adevărată problemă de ordin toxicologic. Intoxicația cu cadmiu se manifestă prin: cefalee, scăderea tensiunii arteriale; afecțiuni hepato-renale.

- intoxicația cu mercur - afectează rinichii, SNC și tractul gastrointestinal. Intoxicația cu mercur anorganic este asociată în principal cu efecte periferice: gastroenterita și nefrita tubulară, pe când expunerea la compușii organici afectează în principal SNC, fiind posibile leziuni severe și ireversibile. Intoxicarea cu mercur se manifestă prin: dureri de cap, amețeli, insomnie, oboseală, tulburări vizuale, afecțiuni ale sistemului nervos, afecțiuni ale rinichilor, malformații congenitale ale fătului în cazul femeilor însărcinate.

Efectele biologice ale substanțelor din apă pot fi grupate în trei categorii:

- *substanțe toxice cu efect de prag* – sunt toxice numai peste o anumită concentrație. Astfel de substanțe sunt nitrații, diverse metale care sunt toxice peste concentrația-prag, aceasta poate fi atinsă și treptat prin fenomenul de bioacumulare;

- *substanțe genotoxice* – sunt substanțe toxice ce produc efecte nocive: cancerigene (produc cancer), mutagene (produc mutații genetice) sau teratogene (produc malformații), posibil la orice concentrație, deci pentru care nu s-a putut stabili existența unui prag sub care să nu fie nocive. În categoria substanțelor genotoxice pentru om intră arsenul, unele substanțe organice sintetice, mulți compuși organici halogenați, unele pesticide;

- *elemente esențiale* – sunt substanțe care trebuie să facă parte obligatoriu din dieta organismului. La om, astfel de substanțe esențiale sunt seleniul, fluorul, iodul.

➤ Calitatea chimică și bacteriologică a apei potabile

Direcția de Sănătate Publică Galați, prin Compartimentul de Evaluare a Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă, monitorizează calitatea apei potabile distribuită în municipiul Galați, conform Legii 458/2002 republicată și actualizată.

În anul 2017, au fost prelevate, un număr de **2681** probe de apă de la stațiile de apă și consumatori, unități de industrie alimentară, fântâni și puțuri forate.

Din totalul de **2681 probe**, **964** probe au fost recoltate din mediul urban și **1717** probe din mediul rural.

Din probele recoltate de la stațiile de apă și consumatorii din mediul urban **nu au fost** probe necorespunzătoare chimic și bacteriologic.

Din cele **1717** probe recoltate din mediul rural, **17** au fost necorespunzătoare chimic. Probele necorespunzătoare chimic s-au înregistrat la **5** de stații de apă care prezintă depășiri la fier, turbiditate, amoniac. Stația Nămolosa care a avut depășiri la fier, turbiditate, amoniac, are program de conformare până în luna februarie 2018, stațiile Furcenii Vechi, Smârdan, Cișmele sunt în Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Galați în perioada 2014-2020, stația de alimentare cu apă Cuca s-a extins cu 2 foraje noi.

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2 0 1 7 ~

În județul Galați sunt 100 sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă. Cu toate primăriile din mediul rural și cu producătorii de apă s-au încheiat contracte de monitorizare de control și de audit a calității apei potabile.

În conformitate cu prevederile Legii 458/2002, cu modificările și completările ulterioare, au fost prelevate și analizate **314** de probe de apă din fântâni și izvoare. Din acestea probe **120** au fost necorespunzătoare chimic prin depășiri ale indicatorilor nitriți, nitrați și **168** necorespunzătoare bacteriologic. Pentru fântânile cu depășiri la nitriți, nitrați s-au dispus primăriilor locale și cabinetelor medicale individuale următoarele măsuri:

1. informarea populației privind riscul asupra stării de sănătate;
2. inscripționarea fântânilor cu litera N cu vopsea neagră;
3. întocmirea de către dispensarele medicale de procese verbale cu gravidele și familiile cu copii 0-1 an prin care li se indică o sursă de apă potabilă alternativă. Pentru fântânile necorespunzătoare bacteriologic s-a dispus primăriilor dezinfectia cu substanțe clorigene.

În anul 2017 s-au recoltat **14** probe de apă din unități de producție alimentară care au fost corespunzătoare chimic și bacteriologic.

Sursa: Raport activitate 2017 - Direcția de Sănătate Publică Galați

➤ **Posibilul impact al calității apei potabile asupra sănătății:** nu s-au înregistrat cazuri de boli infecțioase transmise prin consumul apei potabile, nici ca urmare a contaminării apei potabile.

➤ **Evoluția cazurilor de methemoglobinemie (cazuri/an)**

Tabel VIII.1.3.1. Număr cazuri methemoglobinemie 2010-2017, trimestrial

Anul	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Număr cazuri methemoglobinemie	4, din care: trim. I – 3 trim. II – 1	0	4, din care: trim. I – 2 trim. III – 2	0	0	1	0	0

➤ **Număr cazuri de methemoglobinemie infantilă generate de apa de fântână**

În anul 2017 nu s-au înregistrat cazuri de methemoglobinemie acută infantilă. Anual se transmit cabinetelor medicale individuale (medicina de familie), recomandări privind încheierea de procese verbale cu gravidele și familiile cu copii 0-1 an privind sursele de apă potabilă ce pot fi folosite.

Sursa: Direcția de Sănătate Publică Galați

VIII.1.4. Spațiile verzi și efectele asupra sănătății și calității vieții

VIII.1.4.1. Suprafața ocupată de spațiile verzi în aglomerările urbane

➤ **Importanța spațiilor verzi în ansamblul localităților urbane**

Zonele verzi variază considerabil, atât în funcție de tipul și dimensiunea acestora, cât și datorită diversității de modele urbane. Echilibrul dintre spațiile deschise și zonele construite este dat de particularitățile geologice, climatice, hidrologice, topologice, de relief și de varietatea tradițiilor culturale, dar și de modelele de viață pe care le au comunitățile respective (Cartea Verde privind Coeziunea Teritorială).

**CAPITOLUL VIII – MEDIUL URBAN, SANATATEA SI CALITATEA VIETII
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI**

Realizarea climatului natural în spațiul urban se fundamentează pe amenajarea sau îmbunătățirea de spații verzi în orașe și de refacerea sau extinderea cadrului natural, din exteriorul orașelor. Aceste spații verzi îndeplinesc mai multe funcțiuni, acestea manifestându-se în cadrul ecologic (prin protecția mediului), istoric, cultural, social sau economic.

1. Funcțiile de protecție și ameliorare a mediului ambiant

În contextul artificializării crescânde a mediului de viață al oamenilor, rolul ecologic al zonelor verzi se situează pe prim plan, decurgând din multiple acțiuni ale acestora, foarte importante pentru habitatul uman, mai ales în zonele care nu beneficiază de apropierea pădurilor extinse pe mari suprafețe. Funcțiile zonelor verzi care contribuie în mod esențial la calitatea mediului de viață în teritoriul urban sunt: *ameliorarea microclimatului urban, purificarea atmosferei și atenuarea poluării fonice, ameliorarea solului.*

1.1. Ameliorarea microclimatului urban

În orașele sărace în zone verzi și în cele în care distribuția acestora este deficitară, microclimatul se caracterizează prin regimul termic nefavorabil, uscăciunea atmosferei și reducerea curenților de aer naturali. Vegetația lemnoasă din cuprinsul orașelor moderează temperaturile excesive și atenuează variațiile de temperatură diurne și sezoniere. Spațiile verzi influențează favorabil microclimatul și prin stimularea schimburilor de aer. Diferența de temperatură dintre zonele verzi și aglomerările de construcții sau teritoriile deschise, lipsite de plantații, duce în perioadele de calm canicular la formarea unor curenți de aer ce pot atinge 1 m/s. Această briză urbană, cu sensul dinspre zonele plantate către zona construită în timpul zilei și invers în timpul nopții, contribuie la schimbul caloric și la dispersarea poluării. Totodată zonele arborizate protejează împotriva vânturilor puternice, diminuându-le considerabil viteza.

1.2. Purificarea atmosferei de către zonele verzi

Reducerea poluării atmosferei constituie o problemă dificil de rezolvat, fiind necesare în primul rând măsuri complexe care vizează tehnologiile industriale și procedeele tehnice pentru limitarea emisiilor de poluanți. Un rol important în asanarea atmosferei îl au zonele verzi, prin acțiuni de epurare fizică, chimică și bacteriologică. Masele de verdeață epurează atmosfera îndeosebi prin reținerea prafului și pulberilor. Frunzele acumulează de asemenea, prin aderență, funingine, gudroane și uleiuri din aerosolii poluanți.

Epurarea chimică exercitată de masele vegetale este deosebit de importantă, în primul rând prin consumarea CO₂ și menținerea echilibrului oxigenului în atmosferă. Principalele surse de oxigen ale planetei noastre sunt plantele verzi terestre și planctonul oceanelor. În procesul asimilației clorofilene, la lumina solară frunzele absorb bioxidul de carbon efectuând sinteze biologice și elimină oxigen și ozon. Bilanțul zi-noapte fiind în favoarea producției de oxigen, spațiile verzi reprezintă principalele rezervoare de aer curat. La nivel local, în zilele calme și călduroase în preajma unităților industriale și pe arterele intens circulate, concentrația CO₂ atinge valori mai mari, concomitent resimțindu-se insuficiența oxigenului. În aceste condiții, se impune cu necesitate protejarea vegetației de orice fel, dar mai ales a spațiilor verzi și crearea de noi suprafețe plantate, suficient de întinse și bine arborizate.

Epurarea bacteriologică a aerului de către zonele verzi este de asemenea rezultatul acțiunii masele de frunze. Prin aceleași mecanisme de captare ca pentru praf, frunzele rețin microorganismele asupra cărora se exercită acțiunea sterilizatoare a radiațiilor ultraviolete și a ozonului degajat de plante. S-a constatat că în parcuri concentrația de germeni se reduce progresiv de la periferie către centru, grație acțiunii benefice a plantațiilor.

Măsurătorile efectuate în marile aglomerări comparativ cu interiorul parcurilor scot mai mult în evidență influența pozitivă a vegetației privind purificarea microbiană.

1.3. Atenuarea poluării fonice

Zgomotele cele mai frecvente în mediul urban au o intensitate cuprinsă între 40 și 80 decibeli. Masele dense de frunziș ale arborilor și arbuștilor interceptează energia fonică a surselor de zgomot și o atenuează, în măsura în care plantațiile sunt suficient de compacte și largi. În orașe, plantațiile stradale, adesea numai din șiruri de arbori, nu au nici un efect de protecție, iar plantațiile rare dintre blocuri și scuarurile cu suprafață restrânsă reduc zgomotele numai cu 4-5 decibeli – efect aproape nesensibil. În parcuri însă, plantațiile dese, perimetrare, oferă pentru vizitatori o protecție antifonică evidentă mai ales în timpul sezonului de vegetație. Combinând acest efect cu cel al modelărilor de relief și al altor obstacole nepenetrante se pot obține rezultate remarcabile de reducere a zgomotelor.

1.4. Protejarea și ameliorarea solului

Vegetația este un factor pedogenetic: prin resturile vegetale de la suprafața solului (litiera) și din sol (rădăcini moarte), descompuse de microorganisme, solul se regenerează și devine mai fertil. În amenajările de spații verzi pe terenuri relativ sărace, cu timpul, calitatea solului din ariile plantate se ameliorază, la aceasta contribuind și unele lucrări ca afânarea, adăugarea unui strat superficial de protecție (mulcire) din materiale vegetale. În amenajările peisagistice cu terenuri în pantă, vegetația permite fixarea solului, prevenirea eroziunii și a alunecărilor.

2. Funcțiile sociale

2.1. Crearea unor ambianțe psiho-relaxante

Amenajările peisagistice sunt benefice pentru sănătatea oamenilor nu numai prin crearea unui microclimat mai favorabil și a unui mediu mai calm, cu aer mai curat și mai bine oxigenat, ci și prin influența asupra stării neuro-psihoice, mai ales în parcuri și grădini, unde vizitatorul pătrunde în mod deliberat pentru a se relaxa.

2.2. Funcția recreativă

Se știe că sănătatea omului este influențată nu numai de echilibrul mediului ci și de compensarea efortului fizic și intelectual al muncii și a solicitării nervoase prin activități recreative. Recrearea în natură este tot mai mult adoptată, reprezentând în același timp o evadare din obișnuit și o modalitate de a profita direct de acțiunile benefice ale factorilor naturali.

Pentru locuitorii orașelor, opțiunea recreării în aer liber este condiționată de timpul de deplasare necesar, de facilitatea deplasării, de organizarea și dotarea peisajelor amenajate, de ambianța naturală a acestora. Timpul liber zilnic fiind în general limitat, populației îi stau la dispoziție mai ales spațiile verzi intravilane: scuaruri, grădini, parcuri.

3. Funcția estetică

În localități sunt constituite în mod special spații libere care, pe lângă alte funcții, au menirea de a înfrumuseța și armoniza diferitele componente ale cadrului construit; plantațiile, peluzele de iarbă, decorațiunile florale alcătuiesc peisaje integrate structurilor urbane. Ele pun în valoare arhitectura construcțiilor, conferă varietate ansamblurilor compuse din elemente asemănătoare, imprimă "personalitate" orașelor, cartierelor, străzilor.

4. Funcțiile utilitare ale unor zone verzi

Anumite categorii de amenajări au ca scop protecția unor obiective speciale, a resurselor hidrologice și a terenurilor.

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2 0 1 7 ~

În zonele industriale se prevăd plantații speciale cu funcția de diminuare a propagării nocivităților către teritoriile învecinate; constituite din specii rezistente la poluare, ele se amplasează în principal pe direcția vânturilor dominante.

De asemenea, bazinele deschise de apă (acumulările) din surse de suprafață și instalațiile centrale de aprovizionare cu apă potabilă trebuie să dispună de perdele de protecție sanitară.

În lungul autostrăzilor, uneori se dispun perdele anti-far separând sensurile de circulație, iar în vecinătatea localităților se amplasează perdele antifonice din vegetație deasă, multietajată.

Prin amenajarea de zone verzi se poate realiza îmbunătățirea și valorificarea unor terenuri neproductive sau neconstruibile; plantațiile de arbori și arbuști sunt utilizate pentru fixarea alunecărilor de teren și a solurilor nisipoase instabile, pentru asanarea terenurilor mlăștinoase, alegându-se speciile adecvate acestor folosințe.

Sursa: Arhitectură peisageră- Ana Felicia Iliescu

➤ Descrierea indicatorului – suprafața spații verzi/cap locuitor

Termenul de spațiu verde este înscris în cadrul Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (Legea privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi urbane) ca zona verde în cadrul orașelor și municipiilor, definită ca o rețea mozaicată sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al cărei specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și erbacee).

O altă definiție prezintă spațiul verde ca o zonă verde ce constă din teritorii ce au o valoare semnificativă de patrimoniu natural și care necesită protecție și/sau ecosisteme de o biodiversitate unică, amenințate de poluare, ca și coridoare ce leagă „insule” protejate izolate.

În categoria spațiilor verzi urbane intră parcurile, scuarurile, amenajările din fața unor edificii mai importante, grădinile botanice, zonele verzi de-a lungul cursurilor de apă cimitirele, rondurile de la întretăierea unor drumuri mai importante, aliniamentele stradale și chiar unele zone de parcare.

Spațiile verzi urbane sunt de mai multe tipuri:

- acces nelimitat (folosite de un grup restrâns de locuitori: curțile caselor familiale, curțile din cadrul cvartalelor de blocuri, spațiile verzi din cartierele de blocuri, spațiile verzi amenajate pe acoperișurile unor blocuri, precum și balcoanele);
- acces limitat sau cvasilimitat (aliniamente stradale, amenajările verzi din fața unor edificii, spațiile verzi din jurul unor monumente, parcurile, scuarurile, rondurile florale etc.);
- profil specializat (grădini botanice, plantații de protecție etc.).

Autoritățile administrației publice locale au avut obligația, conform normelor Uniunii Europene (UE), să asigure în intravilan o suprafață de spațiu verde de minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.

În administrarea Consiliului Local al municipiului Galați se află, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 și ale Legii nr. 47/2012, următoarele tipuri de spații verzi:

- a) 61,28 ha de spații verzi publice cu acces nelimitat (zona de faleză, parcuri, grădini, scuaruri, peluze stradale);
- b) 71,3 ha de spații verzi publice de folosință specializată (muzee, zone de agrement și parcuri sportive)

La acestea se adaugă și cele insuficient amenajate sau neamenajate, însumând 65,09 ha.

CAPITOLUL VIII –MEDIUL URBAN, SANATATEA SI CALITATEA VIETII AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2017 ~


Calculule făcute în cadrul PUG Galați relevă astfel o suprafață de spațiu verde pe cap de locuitor de 6,89 mp. În această suprafață nu au fost introduse însă cotele specifice aparținând următoarelor zone funcționale, care sunt cuprinse în bilanțul teritorial: instituții publice și servicii, unități industriale și depozitare, păduri, terenuri forestiere, gospodărie comunală, cimitire.

Municipiul Galați dispune de 5 cimitire care totalizează 32,85 ha spații verzi.

Sursa: *Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025*


În ultima perioadă, au beneficiat de lucrări de modernizare și amenajare următoarele parcuri din municipiul Galați:

- *Parcul Rizer (2,6 ha)*, care cuprinde zone de promenadă, locuri de joacă pentru copii, locuri de odihnă pentru adulți, zone pentru animale, alee pentru patine, amfiteatru în aer liber, pergolă și platformă dalată pentru activități expoziționale, două fântâni arteziene, bazine succesive cu apă (iaz), zone comerciale. Investiția a fost co-finanțată din FEDR, prin POR 2007 - 2013;



- *Grădina Publică (8,6 ha)*, prin plantare de arbori, arbuști și gard viu; refacerea aleilor și a scârilor; amenajarea a două parcări cu un total de 74 de locuri; realizarea și dotarea unui loc de joacă pentru copii; realizarea rețelei de iluminat ambiental; reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, realizarea rețelei de irigații și a canalizării pluviale și dotarea cu mobilier urban specific. Investiția a fost co-finanțată din FEDR, prin POR 2007 - 2013;

- *Parcul Viva*, cuprinde spații plantate, un teren de sport, spații pentru copii, pentru câini, aparate de fitness, fântână arteziană, zone pentru skate, promenadă, rampe;



- *Parcul Orașului Copiilor* – spațiu de



joacă inaugurat în anul 2015 prevede o zonă destinată câinilor, o zonă de joacă prevăzută cu suprafață antitraumă din cauciuc turnat și echipamente de joacă noi, o zonă cu echipamente de fitness, un teren multisport

împrejmuit, cu suprafață de joc realizată din cauciuc turnat și o zonă de promenadă prin refacerea aleilor.


RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2017 ~

- Amenajare *Parc Micro 13* aferent blocuri ANL, din str. N. Mantu, cu finanțare din Fondul pentru Mediu;
- Amenajare *Parc Selgros (4,5 ha)*, spațiu de joacă și relaxare cu o suprafață de 45.000 mp, cu finanțare din Fondul pentru Mediu;
- Realizare *Miniparc Micro 39* – obiectiv inaugurat în luna noiembrie 2013;




Grădina Botanică (18 ha)



Faleza Dunării (20 ha)



Parc Carol (CFR)(1,7 ha)



Parc „Mihai Eminescu”(0,3 ha)



Parc Turn TV (1,7 ha)



Parc Libertății (0,9 ha)

CAPITOLUL VIII –MEDIUL URBAN, SANATATEA SI CALITATEA VIETII
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI
~ 2 0 1 7 ~

Vor fi realizate 10 miniparcuri de cartier, prin montarea de echipamente de joacă, aparate de gimnastică, de fitness, mobilier urban, echipament pentru terenuri de joacă și realizarea de lucrări de arhitectură peisagistică a terenurilor de sport și a zonelor de recreere.

Sursa: Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025 -Raport de mediu, aprilie 2017

S.C. Gospodărire Comunală S.R.L., societatea al cărei acționar unic este Consiliul Local Galați asigură administrarea spațiilor verzi și a cimitirelor. Aceasta dispune inclusiv de o seră proprie, unde produce material dendricol și floricol.

➤ **Evoluția suprafeței spațiilor verzi din totalul intravilan, pentru o perioadă de minim cinci ani**

„Registrul spațiilor verzi” s-a realizat în baza Legii 24/2007 și a Ordinului 1549/2008 al Ministerului Dezvoltării. Acesta vizează inventarierea parcurilor și scuarurilor de pe domeniul public, a spațiilor verzi cu acces limitat, din curțile școlilor sau ale altor instituții, dar și a peluzelor din curțile gălățenilor. În baza acestor date se realizează o hartă la scara 1 la 500 și transpunerea în format GIS a spațiilor verzi.

Registrul include în suprafața totală spațiile verzi situate pe terenurile aparținând domeniului public și privat din intravilanul localității, terenurile proprietate publică, degradate, posibil să fie reabilitate și reamenajate ca spații verzi, arbori prezenți pe lângă arterele de circulație, pe terenurile instituțiilor de învățământ, ansamblurilor de locuințe, bisericilor și cimitirelor.



Tabel VIII.1.4.1.1.Evoluția suprafeței spațiilor verzi

Anul	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Suprafața totală spații verzi (ha)	830,78	850,16	875,08	923,09	923,09	923,09	923,09	923,09
Suprafața intravilan (ha)	5920,78	5920,78	5920,78	5920,78	5920,78	6780,94	6734,26	6734,19*

* conform PUG 2015

Sursa: Primăria municipiului Galați


RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI
~ 2 0 1 7 ~

➤ **Evoluția suprafeței spațiilor pe cap de locuitor din mediul urban, tendință în ultimii ani**

In municipiul Galați, Registrul local al Spațiilor Verzi este realizat cu date la nivelul anului 2011, parțial date din anii 2012, 2013.

Suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor pentru anul 2017 s-a raportat la o populație a municipiului Galați de 303205 locuitori, conform Primăriei Municipiului Galați.

Fig. VIII.1.4.1.1. Suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor



Sursa: Primaria Municipiului Galați

➤ **Situația suprafețelor spațiilor verzi și a zonelor de agrement**

Tipul categoriei	Suprafața (ha)
Fâșie de spațiu verde plantată	34,37
Baze de agrement, complexuri și baze sportive	19,55
Cimitire	20,78
Culoare de protecție față de infrastructură	7,92
Edificii de cult	10,13
Grădina botanică, zoologică, publică	31,37
Instituții publice	3,23
Invățământ public	34,16
Cultură (teatre, biblioteci, muzee)	1,72
Păduri, păduri de agrement	27,02
Parc, parc sportiv, parc xpozițional	32,97
Scuar	61,97
Condominiu	176,17
Protecția cursurilor de apă și a lacurilor	65,84
Unități sanitare sau de protecție socială	16,79

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2 0 1 7 ~

Terenuri libere neproductive	228,34
Spații verzi cu caracter utilitar	147,76
Total	923,09

Sursa: Primaria Municipiului Galați

VIII.1.5. Schimbările climatice și efectele asupra mediului urban, sănătății și calității vieții

VIII.1.5.1. Rata de mortalitate în aglomerările urbane ca urmare a temperaturilor extreme în perioada de vară

➤ Incălzirea globală ca rezultat direct sau indirect al activităților umane



Conform raportului „*Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 (Schimbările climatice, impact și vulnerabilitate în Europa 2016)*”, schimbările climatice observate au deja un impact considerabil asupra ecosistemelor, economiei și sănătății oamenilor, precum și asupra bunăstării. Se ating în continuare noi recorduri în ceea ce privește temperaturile globale și europene, nivelul mărilor și nivelul redus al stratului de gheață din Oceanul Arctic. Regimul de precipitații se află în schimbare, crescând,

în general, numărul de precipitații în regiunile umede și scăzând numărul de precipitații în regiunile aride. Volumul ghețarilor și stratul de zăpadă se află în scădere. În același timp, fenomenele climatice extreme, cum ar fi valurile de căldură, precipitațiile abundente și perioadele de secetă cresc ca frecvență și intensitate în multe regiuni. Previziunile climatice îmbunătățite aduc dovezi suplimentare referitoare la faptul că fenomenele climatice extreme se vor intensifica în multe dintre regiunile Europene.

Puncte fierbinți pentru schimbările climatice

Toate regiunile din Europa sunt vulnerabile în fața schimbărilor climatice, însă anumite regiuni vor fi supuse unui impact mai negativ decât altele. Previziunile arată că sudul și sud-estul Europei vor fi puncte fierbinți în ceea ce privește schimbările climatice, având în vedere că aici se așteaptă cel mai mare număr de impacturi negative. Această regiune se confruntă deja cu creșteri semnificative ale temperaturilor pozitive extreme, dar și cu scăderi ale precipitațiilor și debitelor râurilor, ceea ce a sporit riscul de perioade de secetă mai severe, productivitate mai slabă a culturilor, pierderi ale biodiversității și incendii forestiere. Se așteaptă ca valurile de căldură mai frecvente și schimbările în distribuția bolilor infecțioase influențate de climă să ducă la creșterea riscurilor pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor.

Ecosisteme, sănătatea umană și economie

Ecosistemele și zonele protejate din Europa se află sub presiunea schimbărilor climatice și a altor factori de stres, cum ar fi schimbarea folosinței terenurilor. Raportul subliniază faptul că impactul schimbărilor climatice reprezintă o amenințare pentru biodiversitatea pe uscat și pe mare.

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2017 ~

Principalele efecte ale schimbărilor climatice asupra sănătății sunt legate de evenimentele meteorologice extreme, de modificări în distribuția bolilor influențate de climă, precum și de modificări în condițiile de mediu și sociale. În ultimul deceniu, inundațiile cauzate de râuri și din zonele de coastă au afectat milioane de oameni în Europa. Efectele asupra sănătății includ răniri, infecții, expunere la pericole chimice și consecințe asupra sănătății mintale. Valurile de căldură au devenit mai frecvente și mai intense, provocând zeci de mii de cazuri de deces prematur în Europa. Se prevede ca această tendință să crească și să se intensifice, dacă nu se vor lua măsuri de adaptare corespunzătoare. Răspândirea speciilor de căpușă, a țânțarului-tigru asiatic și a altor purtători de boli crește riscul de apariție a unor boli precum boala Lyme, encefalita transmisă de căpușe, febra West Nile, febra denga, Chikungunya și leishmanioza.

Sporirea nivelului de adaptare și a cunoștințelor

Integrarea adaptării la schimbările climatice în alte politici înregistrează progrese, dar poate fi îmbunătățită în continuare. Alte posibile acțiuni suplimentare includ îmbunătățirea coerenței politicilor între diversele domenii de politică și niveluri de guvernare (UE, transnaționale, naționale și sub-naționale), metode de gestionare adaptabilă mai flexibile, precum și combinarea soluțiilor tehnologice cu abordări bazate pe ecosistem și cu măsuri „fără caracter obligatoriu”.

Dezvoltarea și utilizarea serviciilor climatice și de adaptare se află în creștere în Europa. Cunoștințe sporite în diferite domenii ar fi utile, de exemplu în ceea ce privește evaluările de vulnerabilitate și risc la diverse niveluri și în ceea ce privește monitorizarea, raportarea și evaluarea acțiunilor de adaptare, costurile și beneficiile acestora, precum și sinergiile și soluțiile de compromis cu alte politici.


Sursa: <https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016>

➤ Ecosistemul urban

„Ecosistemul urban este reprezentat de către aglomerațiile umane fixate în jurul unor clădiri, instituții și relații care permit viețuirea și tranzitarea unui bogat flux energetic, formând un mozaic eterogen cu răspândiri și densități variabile supuse unor interacțiuni reciproce, în care majoritatea transformări lor de materie, energie și informație este realizată de om.” (Gâștescu P., 1998)

În ansamblu, ecosistemul urban este un complex de factori naturali și artificiali, pozitivi și negativi, care aduc o serie de facilități pentru desfășurarea comodă a vieții, dar expun și la riscuri nocive în funcție de modul de concepție, planificare și organizare a elementelor sale și de modul de folosire chibzuită a acestora de către oameni.

Fig. VIII.1.5.1.1. Ecosistem urban – sistem deschis fara capacitate de autotransport



CAPITOLUL VIII –MEDIUL URBAN, SANATATEA SI CALITATEA VIETII
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI


~ 2 0 1 7 ~

Funcționarea ecosistemului urban devine dependentă de fluxurile de energie și materiale introduse de către om, care sunt luate din "zestrea" capitalului natural, într-un ritm care depășește capacitatea de refacere a acestuia.

Una din cele mai importante trăsături definitorii ale ecosistemului urban o constituie circuitele energetice; acestea sunt puternic perturbate de activitățile omului. Cantitatea de energie introdusă de către om în ecosistemul urban prin diferite căi (îngrășăminte, pesticide dar mai ales energia de intrare din ariile industriale și de locuit) depășește cu mult energia solară introdusă în sistem de către producătorii primari și are drept consecință puternica antropizare a teritoriului urban. Dependența ecosistemului urban față de resurse externe materiale și energetice duce la un mare grad de vulnerabilitate în cazul unei perturbări majore.

Urbanizarea reprezintă una din marile probleme ale omenirii. Complexitatea problemelor legate de managementul ariilor urbane este amplificată de necesitatea stringentă a tranziției socio-economice către o dezvoltare durabilă. Fenomenele negative din orașe au un caracter global și sunt în directă conexiune cu celelalte probleme ale umanității, în special cu creșterea demografică. În plus, problemele legate de marile concentrări de energie și materiale din orașe necesită restructurarea așezărilor umane la nivel micro și macro, prin transformări și conversii ale zonelor funcționale urbane, printr-un atent management al ritmului înlocuirii structurilor spațiale și tehnice și prin promovarea diversității sub toate aspectele sale: socială, urbanistică, funcțională, tehnologică, culturală și politică.

Schița funcțională a ecosistemului urban este prezentată în continuare:



Regândirea și replanificarea structurilor urbane, promovarea unui transport urban durabil, facilitarea unui consum energetic mai mic pe cap de locuitor, reabilitarea termică a

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2 0 1 7 ~

locuințelor și a spațiilor de birouri, transformarea orașelor în „ecosisteme urbane”, utilizarea tehnologiilor „prietenoase cu mediul” axate pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, schimbarea comportamentului populației în ceea ce înseamnă crearea și protejarea spațiilor verzi sunt doar câteva soluții viabile și concrete care pot fi puse în aplicare pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice și pentru îmbunătățirea calității vieții populației.

➤ **Strategia de Dezvoltare a Municipiului Galați 2016-2025**

Strategia cuprinde obiective generale și obiective specifice, detaliate prin măsuri de punere în aplicare. Obiectivul de protecție a mediului și a sănătății populației este acela de a identifica un sistem echilibrat de armonizare a mediului și a activităților umane, care să aibă ca rezultat dezvoltarea acceptabilă a activităților antropice, calității mediului și calității vieții și sănătății.

Câteva obiective specifice prevăzute în Strategia de dezvoltare a municipiului Galați:

Obiectivul general	Obiectiv specific	Efectele pozitive asupra mediului
Dezvoltarea relațiilor spațiale teritoriale și suprateritoriale – „Galați oraș durabil”	Implementarea unui sistem de management al transportului	Impactul este pozitiv asupra factorului de mediu aer, ca urmare a fluidizării traficului și reducerii emisiilor de gaze, ca urmare a reducerii consumului de carburanți, prin proiectele implementate. Impact puternic pozitiv asupra populației/sănătății umane ca urmare a creșterii siguranței circulației în trafic și a posibilităților de comunicare și de informare a cetățenilor, scade intensitatea traficului și se reduc emisiile de gaze, zgomot și vibrații.
	Implementarea și dezvoltarea sistemului de transport nepoluant	Impact puternic pozitiv asupra calității aerului ca urmare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Impact puternic pozitiv asupra calității vieții și sănătății populației, ca urmare a implementării sistemului municipal de încurajare a utilizării și facilitării de mijloace de transport nepoluante, inclusiv în urma amenajărilor pistelor de biciclete, a zonelor de promenadă.
Dezvoltare urbană „Galați oraș orientat spre comunitate”	Dezvoltarea unui sistem de generare și distribuție a energiei sustenabile	Obiectivul conduce la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, având un impact puternic pozitiv asupra aerului. Obiectivul va avea un efect puternic pozitiv asupra sănătății umane, prin îmbunătățirea calității vieții.
	Reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale și	Obiectivul, prin proiectele propuse, va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ceea ce va avea un impact pozitiv

CAPITOLUL VIII –MEDIUL URBAN, SANATATEA SI CALITATEA VIETII AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2017 ~

	municipale	asupra aerului. Obiectivul va avea un efect puternic pozitiv asupra sănătății umane, prin îmbunătățirea calității vieții și prin utilizarea rațională a resurselor naturale.
--	------------	--

Implementarea SDMG 2016-2025 va contribui la reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice asupra mediului și adaptarea la efectele acestora, în special reducerea emisiilor de GES prin reducerea emisiilor provenite din arderea combustibililor fosili, ca urmare a sprijinirii investițiilor ce vizează utilizarea surselor regenerabile pentru producerea energiei termice. Prin dezvoltarea transportului public urban și stimularea deplasării nemotorizate în oraș, se va reduce nivelul de noxe (CO₂, NO_x, pulberi, PM₁₀), ca urmare a achiziționării de mijloace de transport ecologice, crearea de piste pentru bicicliști, a sistemului de tip Park and Ride, etc. Reamenajarea și extinderea spațiilor verzi va conduce la reducerea impactului schimbărilor climatice. Creșterea eficienței de utilizare a energiei în sectorul clădirilor publice și rezidențiale conduce la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi. Emisiile reduse și utilizarea durabilă a biomasei în scopuri energetice contribuie la reducerea costurilor proprii de producție, prin reducerea costurilor de energie, precum și utilizarea energiei din surse regenerabile.

➤ **Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Galați**

Un plan de mobilitate urbană durabilă este un plan strategic conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în orașe și în împrejurimile acestora, pentru a avea o mai bună calitate a vieții. Acesta vizează crearea unui sistem de transport urban durabil prin:

- Facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă și la servicii;
- Îmbunătățirea siguranței și securității;
- Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;
- Creșterea eficienței și a eficacității costurilor pentru transportul de persoane și mărfuri;
- Creșterea atractivității și a calității mediului urban.

Insuficiența locurilor de parcare, lipsa pistelor pentru bicicliști, starea proastă a trotuarelor și a carosabilului, dimensiunea căilor de rulare, traficul aglomerat pe principalele artere, subvențiile și facilitățile acordate în transportul public, precum și siguranța rutieră au fost principalele probleme identificate, în cadrul consultărilor privind elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Galați are ca scop crearea unui sistem de transport urban durabil, multimodal și integrat, prin abordarea următoarelor aspecte:

- Garantarea unui sistem de transport disponibil și accesibil tuturor;
- Îmbunătățirea siguranței și securității tuturor modurilor de transport și reducerea numărului de accidente;
- Reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;
- Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane, inclusiv definirea surselor de finanțare pentru astfel de activități;
- Contribuția la creșterea atractivității și calității mediului urban și a designului urban;

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2017 ~

- Elaborarea unui set de indicatori, în ceea ce privește mobilitatea, dezvoltarea socio-economică și urbană a orașului, care vor fi monitorizați în evaluarea eficacității Planului în relație cu obiectivele stabilite;
- Dezvoltarea mijloacelor non-motorizate și a rețelilor de transport intermodal;
- Propunerea de recomandări cu privire la oportunități de participare a sectorului privat în furnizarea serviciilor de transport urban în Municipiul Galați

➤ Variația medie anuală a temperaturii aerului

Situația variațiilor de temperatură pentru perioada 1901–2000, respectiv anual gradat pentru anii 2007–2017 este prezentată în tabelul VIII.1.5.1.1., cu precizarea valorilor maxime și minime, inclusiv media anuală, valori înregistrate la stațiile meteorologice Galați și Tecuci.

Tabel VIII.1.5.1.1.

Anii	Stația meteorologică	Temperatura medie anuală	Temperatura minimă anuală/data	Temperatura maximă anuală/data
1901-2000	Galați	10,5 ⁰ C	- 28,6 ⁰ C 10 februarie	40,2 ⁰ C 5 iulie
2007	Galați	13,1 ⁰ C	-13,1 ⁰ C februarie	40,5 ⁰ C iulie
2008	Galați	12,5 ⁰ C	-15,3 ⁰ C 5 ianuarie	37,9 ⁰ C 16 august
2009	Galați	12,3 ⁰ C	-14,4 ⁰ C 19 decembrie	38,4 ⁰ C 24 iulie
2010	Galați	11,8 ⁰ C	-21,5 ⁰ C 25 ianuarie	37,6 ⁰ C 13 august
	Tecuci	10,9 ⁰ C	-22,4 ⁰ C 26 ianuarie	37,6 ⁰ C 13 august
2011	Galați	11,0 ⁰ C	-16,2 ⁰ C 31 ianuarie	36,0 ⁰ C 9 iulie
	Tecuci	10,3 ⁰ C	-19,1 ⁰ C 31 ianuarie	34,3 ⁰ C 9 iulie
2012	Galați	12,2 ⁰ C	-19,8 ⁰ C 9 februarie	39,9 ⁰ C 25 august
	Tecuci	11,1 ⁰ C	-22,5 ⁰ C 2 februarie	40,4 ⁰ C 7 august
2013	Galați	12,3 ⁰ C	-13,1 ⁰ C 10 ianuarie	35,5 ⁰ C 14 august
	Tecuci	11,2 ⁰ C	-16,4 ⁰ C 10 ianuarie	34,5 ⁰ C 30 iulie
2014	Galați	11,8 ⁰ C	-18,4 ⁰ C 31 ianuarie	36,4 ⁰ C 13 august
	Tecuci	11 ⁰ C	-19,9 ⁰ C 31 ianuarie	34,9 ⁰ C 13,14 august

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI
~ 2017 ~

2015	Galați	12,6 ⁰ C	-18,3 ⁰ C 8 ianuarie	38,4 ⁰ C 11 august
	Tecuci	11,8 ⁰ C	-21,5 ⁰ C 8 ianuarie	36,7 ⁰ C 26 iulie
2016	Galați	12,4 ⁰ C	-14,6 ⁰ C 24 ianuarie	36,1 ⁰ C 21 iunie/ 1august
	Tecuci	11,6 ⁰ C	-14,5 ⁰ C 4 ianuarie	35,3 ⁰ C 1 august
2017	Galați	12,1 ⁰ C	-15,2 ⁰ C 10 ianuarie	38,6 ⁰ C 1 iulie
	Tecuci	11,1 ⁰ C	-17,7 ⁰ C 13 ianuarie	37,9 ⁰ C 6 august


Valorile maxime ale temperaturilor înregistrate în perioada 2007 – 2017, respectiv temperatura maximă anuală a aerului (°C) din perioada 2007 – 2017, temperatura maximă absolută (°C), la stațiile meteorologice din județul Galați, este prezentată în tabelul VIII.1.5.1.2.

Tabel VIII.1.5.1.2. Temperaturi maxime

Perioada / Anii											
Temperatura maximă absolută (°C)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Galați	40,5	37,9	38,4	37,6	36,0	39,9	35,5	36,4	38,4	36,1	38,6
Tecuci	-	-	-	37,6	34,3	40,4	34,5	34,9	36,7	35,3	37,9

Evoluția temperaturilor maxime înregistrate la stațiile meteorologice Galați și Tecuci, conform datelor comunicate de Centrul Meteorologic Regional Moldova, este reprezentată în graficul din figura VIII.1.5.1.2.

Figura VIII.1.5.1.2. Evoluția temperaturilor maxime



RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI
~ 2017 ~

Perioade (număr de zile) în care s-au înregistrat temperaturi caniculare, în 2017

Tabel VIII.1.5.1.3

Stația meteo	Luna/nr. zile			Anul 2017
Galați	VI/1	VII/1	VIII/6	8
Tecuci	-	VII/1	VIII/4	5

Sursa: Centrul Meteorologic Regional Moldova

- **Rata de mortalitate în aglomerările urbane ca urmare a temperaturilor extreme în perioada de vară** (datele sunt pentru anul 2017 și nu pot fi liniar asociate perioadei de caniculă)
 - **indicatorii de sănătate relevanți dependenți de variațiile temperaturii**
 - morbiditate prin afecțiuni C-V: 558,87
 - morbiditate infarct miocardic acut: 424,81
 - **cazuri de îmbolnăviri cu encefalită, boala Lyme înregistrate în anul 2017, în județul Galați**

Tabel VIII.1.5.1.4. Număr total cazuri boala Lyme

Nr. total	Număr total cazuri, din care:	cazuri confirmate	cazuri probabile	cazuri infirmate
Boala Lyme	1	0	0	1
Encefalita	3	3	0	0

- **Rata morbidității prin incidența bolilor neinfecțioase, la 100.000 locuitori:**
 - tumori maligne: 159,88;
 - tulburări psihologice: 177,57;
 - boli ale sistemului respirator: 12741;
 - diabet: 165,3;
 - boli ale sistemului circulator: 849,95;
 - hipertensiune: 715,89.
- **Rata morbidității prin incidența bolilor neinfecțioase, corelată cu zilele în care s-au înregistrat temperaturi caniculare:**
 - morbiditate prin expunere la forțele naturii-incidența de 18,6.

Sursa: Direcția de Sănătate Publică Galați

VIII.1.5.2. Expunerea populației din aglomerările urbane la riscul de inundații

Indicator RO 61: Inundațiile și sănătatea

Este definit ca numărul de persoane afectate de inundații raportat la un milion de locuitori.

Inundațiile constituie fenomene naturale și sunt o componentă a ciclului hidrologic natural al Pământului. Acestea au marcat, de-a lungul vremii, dezvoltarea societății umane, ele fiind,

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2 0 1 7 ~

din punct de vedere geografic, cele mai răspândite dezastre de pe glob, cele mai mari producătoare de pagube și victime omenești.

Se cunoaște cu precizie faptul că activitățile umane, cu intervențiile antropice în procesele naturale, au modificat considerabil situația în aproape toate bazinele hidrografice. Deși inundațiile constituie un fenomen natural, ele pot fi intensificate ca urmare a deteriorării mediului înconjurător, ca, spre exemplu, modificarea sistemelor de colectare a apelor prin urbanizare, practici agricole inadecvate, despăduriri. Este una dintre cauzele pentru care, în multe situații, impactul inundațiilor, exprimat în termeni de viață și sănătate umană, dar și în pierderi economice, a crescut.

Managementul riscului la inundații înseamnă aplicarea unor politici, proceduri și practici având ca obiective identificarea riscurilor, analiza și evaluarea lor, tratarea, monitorizarea și reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora, astfel încât comunitățile umane, toți cetățenii să poată trăi, munci și să-și satisfacă nevoile și aspirațiile într-un mediu fizic și social durabil.

De-a lungul timpului, au existat mai multe forme de abordare a fenomenului, de la noțiunea de luptă împotriva inundațiilor, omul a trecut succesiv la noțiunile de apărare împotriva inundațiilor și apoi la prevenirea inundațiilor.

Inundațiile produse în numeroase țări în ultimii ani și consecințele lor au condus, pe fondul unei creșteri a responsabilității sociale, la o nouă abordare, aceea de management al riscului la inundații, care se realizează coordonat de către toți factorii responsabili și care presupune conștientizarea și implicarea comunităților umane în evitarea pierderilor de vieți omenești și reducerea pagubelor.


Practica a demonstrat că apariția inundațiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic, care conduc la un șir de măsuri și acțiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene.

Problema esențială în managementul riscului la inundații este aceea a riscului acceptat de populație și decidenți, știut fiind că nu există o protecție totală împotriva inundațiilor (risc zero), după cum nu există nici un consens asupra riscului acceptabil. În consecință, riscul acceptabil trebuie să fie rezultatul unui echilibru între riscul și beneficiile atribuite unei activități ca urmare a reducerii riscului la inundații sau a unei reglementări guvernamentale. Pentru zonele urbane se adoptă conceptul că pe termen lung, acestea trebuie/urmează să fie apărate la o frecvență de apariție a viiturii de 1:100 ani, pentru a asigura o dezvoltare durabilă a localităților. Diminuarea consecințelor inundațiilor este rezultatul unei combinații ample, între măsurile și acțiunile premergătoare producerii fenomenului (activități de prevenire, de protecție și de pregătire), cele de management din timpul desfășurării inundațiilor (acțiunile de răspuns întreprinse în timpul inundațiilor, cunoscute sub denumirea de managementul situațiilor de urgență) și cele întreprinse post inundații (de reconstrucție și învățăminte deprinse ca urmare a producerii fenomenului).

Pentru stabilirea unui cadru privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, cu scopul de a reduce consecințele negative pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniu cultural și activitatea economică asociate cu inundațiile, la nivelul Uniunii Europene a fost adoptată **Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații**.

Etapele implementării Directivei Inundații și termenele de finalizare:

*RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI
~ 2 0 1 7 ~*



Planul de Management al Riscului la Inundații (PMRI) aferent celor 11 bazine hidrografice și fluviului Dunărea - porțiunea cuprinsă pe teritoriul României, pentru perioada 2016 - 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial din 6 februarie 2017, inițiativa fiind o condiție esențială pentru accesarea fondurilor europene destinate lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor. Acesta cuprinde măsuri specifice și concrete, inclusiv lucrări de investiții, care urmăresc cele cinci domenii de acțiune din ciclul de management al riscului la inundații: prevenire, protecție, pregătire, conștientizarea riscului la inundații, refacere/reconstrucție. Măsurile vor fi implementate la nivel național de către toate instituțiile cu atribuții în managementul acestui tip de risc.

În spiritul prevederilor Directivei 2007/60/CE, s-a elaborat **Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung (perioada 2010 – 2035)**, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 846 din 11.08.2010.

Scopul acesteia este de a preveni și reduce consecințele inundațiilor asupra activităților socio-economice, a vieții și sănătății oamenilor și a mediului. Aceasta vizează o gestionare integrată a apei și a resurselor adiacente: amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbană, protecția naturii, dezvoltarea agricolă și silvică, protecția infrastructurii de transport, a construcțiilor și a zonelor turistice, protecția individuală etc. Pentru gestionarea riscului la inundații această strategie stabilește aplicarea unor politici, proceduri și practici având ca obiective identificarea riscurilor, analiza și evaluarea acestora, tratarea, monitorizarea și reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora, astfel încât comunitățile umane și toți cetățenii să poată trăi, munci și să își satisfacă nevoile și aspirațiile într-un mediu fizic și social durabil.

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2 0 1 7 ~

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, a realizat **Master Planul privind managementul riscului la inundații** în concordanță cu Strategia Națională de management a riscului la inundații. Master Planul tratează regimul riscului la inundații în bazinele Prut și Bârlad și a fost realizat prin culegere de date, modelare hidrologică și hidraulică, studii tehnice de specialitate, consultări cu instituțiile relevante și informații vizuale pe teren, constând în:

- identificarea zonelor de risc la inundații în bazinele hidrografice Prut și Bârlad
- identificarea principalelor cauze ale inundațiilor în zona studiată
- cuantificarea riscului la inundații privind populația, bunurile, infrastructura
- stabilirea unui cadru strategic de apărare în caz de inundații și demonstrarea eficienței măsurilor de gestionare a riscului la inundații
- stabilirea priorităților privind investițiile necesare reducerii riscului la inundații aliniate la legislația europeană și în concordanță cu legislația română, ceea ce a condus la următoarele priorități:

- definirea unui management adecvat care pune în aplicare cadrul strategic de risc la inundații
- identificarea obiectivelor de protecție împotriva inundațiilor și aprecierea eficienței acestora corespunzător cu starea tehnică
- verificarea tehnică în vederea efectuării lucrărilor de remediere necesare pentru a menține sau îmbunătăți starea și performanța obiectivelor necesare protecției împotriva inundațiilor

- reducerea riscului de vătămare corporală, pierderea de vieți omenești și pagube materiale și a reducerii impactului asupra mediului generat de inundații

- în scopul luării deciziilor corespunzătoare privind reducerea riscului la inundații vor trebui analizate informațiile și hărțile disponibile în vederea stabilirii eficienței în acest scop

- alegerea măsurilor corespunzătoare în vederea reducerii riscurilor la inundații pentru comunități

- colaborarea dintre administrația locală, agenții economici, populația din zonă în vederea participării active la reducerea riscului la inundații: intervenția rapidă în caz de situație de urgență pentru a diminua pagubele provocate de pericolele de inundații, punerea în aplicare a măsurilor de reducere și acordarea sprijinului privind aplicarea planului de intervenții în caz de inundații.

Master Planul stabilește oportunitatea pentru a integra managementul riscului la inundații în procesul de planificare și a evita dezvoltarea neconformă în zonele cu risc la inundații.

Principalele cauze și mecanisme ale inundațiilor din bazinele hidrografice Prut-Bârlad ce au fost identificate sunt prezentate mai jos:

- scurgerea rapidă de pe suprafața versanților, glaciali cu niveluri scăzute de infiltrare. Acest fenomen este grav în timpul precipitațiilor de înaltă intensitate din timpul perioadei calde a anului. Efectele cauzează inundații rapide asupra comunităților localizate în albiile majore ale cursurilor de apă.
- apa din inundații bălțește natural în câmpiile inundabile joase, meandrate ale bazinului Prut. Confluențele acestor sisteme sunt suprafețe ale fostelor depresiuni glaciare, care sunt expuse la inundații prelungite.
- în bazinul Bârlad, râurile abrupte, directe, din zonele înalte descarcă rapid apa, conducând la inundații complexe, produse în timp foarte scurt, la confluența râurilor Bârlad, Siret și Tecucel.

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2 0 1 7 ~

- sistemele urbane de drenaj nu au capacitatea necesară pentru a colecta și evacua debitele produse la viituri.

Factorii ce pot exacerba inundațiile din arealul analizat sunt următorii:

- existența unei suprafețe erodate de 900 de milioane de mp - evidențiată prin cartografiere- lipsită de vegetație, contururile de eroziune crescând în timp,
- scurgerea rapidă a apei din precipitații conduc la inundații datorită infiltrației lente în sol a apei meteorice,
- managementul terenurilor arabile și modelele de pășunat cresc rata scurgerii apei de suprafață și a eroziunii, cu reducerea infiltrației în sol,
- infiltrațiile lente în sol pe versanți cresc procentul de apă din precipitații ce se descarcă în râuri,
- ratele de eroziune ridicate contribuie la colmatarea râurilor și lacurilor, ceea ce reduce capacitatea de transport și atenuare,
- digurile râurilor cresc energia mecanică a apei, fenomen ce conduce la eroziunea culeelor podurilor și colapsuri de poduri prin spălarea albiilor râurilor în timpul creșterii nivelului apei.

Abordarea actuală a managementului riscului la inundații se concentrează pe protecția împotriva inundațiilor, de răspuns la situații de urgență, precum și evitarea și reducerea riscului la inundații.

➤ Număr localități urbane afectate de inundații în ultimii ani

Anul	Nr. evenimente înregistrate
2010	S-au înregistrat 2 evenimente, produse în perioada iunie și iulie 2010 ca urmare a viiturilor simultane propagate pe cursurile de apă: fluviul Dunăre (viitura istorică), Siret și Prut, precum și de amploarea fenomenului de remuu pe râurile Siret și Prut
2011	Nu s-au înregistrat inundații cu producerea de pagube
2012	Nu s-au înregistrat inundații cu producerea de pagube
2013	S-au înregistrat 3 evenimente produse de inundații ca urmare a precipitațiilor în aversă care au condus la scurgeri importante de pe versanți Perioadele producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase au fost: 21 mai-14 iunie ; 11-13 septembrie și 17-19 septembrie
2014	Nu s-au înregistrat inundații cu producerea de pagube
2015	În luna noiembrie, în municipiul Tecuci, datorită precipitațiilor căzute și inexistenței sistemului de canalizare au fost semnalate inundații în 3 curți
2016	S-au înregistrat 2 evenimente, produse în perioada 2-14 iunie și 11-14 octombrie ca urmare a precipitațiilor abundente, scurgerilor de ape pluviale, revărsare râuri Siret, Suhu, Zeletin și refulare canalizări. Au fost afectate 3 localități urbane, respectiv Tecuci, Berești, Târgu Bujor
2017	Nu s-au produs inundații generate de revărsarea cursurilor de apă

Sursa: <http://www.prefecturagalati.ro-Situații de urgență>; SGA Galați

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI

~ 2017 ~

Raportarea victimelor la inundații în țara noastră se face în cadrul **rapoartelor operative și de sinteză** pe care primăriile le transmit Inspectoratului județean pentru situații de urgență și Centrului operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor pe timpul producerii fenomenelor periculoase. Se menționează că, în general, informațiile privind pagubele sunt



mai deficitare, în special pentru inundațiile produse înainte de anii 1990, numărul victimelor fiind, cel mai probabil, pentru această perioadă, subevaluat.

De aceea, în anumite cazuri, pentru descrierea numărului de victime asociate evenimentelor istorice semnificative, s-a apelat și la alte surse de documentare (literatura de specialitate, arhive).

Se menționează că nu există informații cu privire la detalierea cauzelor pierderilor de vieți omenești - decese provocate de viitură (termen scurt) sau decese datorate îmbolnăvirilor/ rănilor provocate de inundații (termen lung).

➤ **Cantități de precipitații atmosferice**

Precipitațiile atmosferice cuprind totalitatea produselor de condensare și cristalizare a vaporilor de apă din atmosferă, denumite și hidrometeori, care cad de obicei din nori și ajung la suprafața pământului sub forma lichidă (ploaie și aversă de ploaie, burniță etc.), solidă (ninsoare și aversă de ninsoare, grindină, măzărice etc.) sau sub ambele forme în același timp (lapovița și aversa de lapoviță). Conform precizărilor de pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, particularitățile și repartiția precipitațiilor, ca și a altor elemente meteorologice, depind direct de caracterul mișcărilor aerului, respectiv de gradul de dezvoltare al convecției termice, dinamice sau orografice, precum și de deplasările advectionale. Principala caracteristică a regimului precipitațiilor atmosferice și a repartiției lor spațio-temporale o reprezintă marea variabilitate și discontinuitatea în timp și în spațiu. Regimul precipitațiilor decurge din interacțiunea factorilor genetici generali (la nivel continental) cu factorii locali.

Precipitațiile atmosferice înregistrate la stațiile meteorologice Galați și Tecuci, comunicate de Administrația Națională de Meteorologie Centrul Meteorologic Regional Moldova, sunt redate mai jos tabelar și grafic.

Tabel VIII.1.5.2.1. Cantități lunare de precipitații, în ultimii ani

Anul/ luna	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Stația meteorologică Galați												
2010	43,6	56,5	34,9	16,6	80,2	99	73	6,2	57,6	101,2	23	90,6
2011	50,9	26,1	2	53,4	34,4	85,8	10,4	24,6	1	18,6	0,6	324,1
2012	63	49,4	10,3	31,5	81,6	59,4	49,2	47,4	32,4	29,1	18,7	587,3
2013	76,4	40,5	59,1	41,6	35	80,6	53,6	20,8	51,4	69,6	28,2	560
2014	78,9	4,9	40,1	55,6	82,2	42	44,8	30,8	5,8	45,9	78,6	601
2015	24,1	44,5	76,5	37,2	11	59,8	22,4	24	24	92,2	122,4	1,6
2016	51,3	18,8	49	53,8	58,2	70,8	23	32,8	111	207,8	61,2	2,8
2017	23,4	48,5	13,6	85	28,8	79,8	154	9,6	3,2	106	52,4	45,2

CAPITOLUL VIII –MEDIUL URBAN, SANATATEA SI CALITATEA VIETII AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI
~ 2017 ~

Anul/ luna	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Stația meteorologică Tecuci												
2010	16,5	82,2	18,6	16,3	37,1	91,7	107,3	28,4	56,8	61,8	18,9	60,8
2011	22,8	27,4	8	35,3	80,4	81,6	63	21,2	10,4	39,8	0,3	17,5
2012	46	40,8	6,7	53,8	136,6	10,2	35,4	22,4	16,6	40,2	9,8	125,4
2013	46	46,3	51,4	34,8	111,8	95,8	40,4	88,2	169,8	54	37,2	5,9
2014	48,2	3,7	35,5	84	133,4	60	38	31,2	3,8	57	64,6	69,4
2015	19	47,2	73,1	21,7	8	63,8	34,4	64,2	32	94,8	119,3	1,1
2016	38,7	9,4	59,1	94	51	163,2	17,2	73,6	45,6	226	41	1
2017	8,7	37	20,5	72,2	21,2	121,2	129	34,8	9,6	68,6	65,2	29,3

Tabel VIII.1.5.2.2. Cantități anuale de precipitații atmosferice

Perioada/ Anii	Stația meteorologică	Cantitatea anuală (l/mp)	Cantitatea maximă în 24 ore (l/mp /data)
2007	Galați	499,6	96,0/ octombrie
2008	Galați	352,2	81,2/ septembrie
2009	Galați	492,9	91,4/ decembrie
2010	Galați	682,4	55,4/ octombrie
	Tecuci	596,4	41,4/ februarie
2011	Galați	324,1	27,4/ iunie
	Tecuci	407,7	38,4/ iunie
2012	Galați	587,3	40,4/ decembrie
	Tecuci	543,9	48,4/ decembrie
2013	Galați	560,0	56,8/1 octombrie
	Tecuci	781,6	71,4/11 septembrie
2014	Galați	601,0	42,7/29 decembrie
	Tecuci	628,8	44/ 24 octombrie
2015	Galați	539,7	50,2/ 11 octombrie
	Tecuci	578,6	48,5/ 28 noiembrie
2016	Galați	740,5	92/12 octombrie
	Tecuci	819,8	106,2/12 octombrie
2017	Galați	649,5	60,2/8 octombrie
	Tecuci	617,3	49,8/25 iulie

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie Centrul Meteorologic Regional Moldova

RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI
~ 2 0 1 7 ~




Figura VIII.1.5.2.1. Cantități de precipitații atmosferice Stația meteorologică Galați